

# La noción de tangente en la educación media superior

Laurent Vivier

[laurent.vivier@univ-orleans.fr](mailto:laurent.vivier@univ-orleans.fr)

Laboratoire André Revuz – Université Paris Diderot  
I.U.F.M. Centre Val de Loire – Université d'Orléans

Autor de correspondencia: Laurent Vivier

**Resumen:** En Francia, la introducción a la derivada se apoya fuertemente en la consideración de rectas tangentes a una curva ;pero la noción de tangente no es definida en forma general! Investigadores en didáctica de las matemáticas abordaron este problema. Una de sus conclusiones fue la necesidad de enseñar la noción de tangente para, después, utilizarla en la introducción de la noción de derivada. Desde un punto de vista didáctico e histórico, propondremos una solución al problema, mediante una adaptación del método de René Descartes, donde se define fácilmente la noción de tangente a las curvas algebraicas. Esta propuesta es importante para modificar las representaciones que tienen muchos de los estudiantes como una idea global, y no local, de la tangente. De esta forma, se puede introducir la noción de derivada a partir de la noción de tangente, cuando la tangente ha adquirido el estatuto de objeto matemático efectivo.

**Palabras Clave:** Tangente, educación, solución.

**Abstrac:** In France, the introduction to the derivative is strongly in the consideration of lines tangent to a curve, but the notion of tangent is not defined in a general way! Researchers in mathematics didactics approach this problem. One of his conclusions was the need to teach the notion of tangent and then use it in the introduction of the notion of derivative. From a didactic and historical point of view, we will propose a solution to the problem, an adaptation of the method by René Descartes, it is easily defined as the notion of tangent to algebraic curves. This proposal is important to modify the representations that many of the students have as a global idea, not a local one, of the tangent. In this way, the notion of derivative of the notion of tangent can be introduced, when the tangent has acquired the status of an effective mathematical object.

**Keywords:** Tangent, education, solution.



*El Cálculo y su Enseñanza.*© septiembre 2010- septiembre 2011  
Vol.2 No. 1.Cinvestav, México D.F. P.p.111-144.

Fecha de recepción: 17-12-2010  
Fecha de aceptación:20-02-2011

## 1. Introducción

En este artículo, se muestra cómo se enseña la noción de la recta tangente en el nivel medio superior, en Francia. Nuestro principal centro de interés es la dificultad que provoca esa enseñanza; y también consideramos, brevemente, el aspecto histórico del desarrollo del tema, mismo que permite proponer una solución al problema de enseñanza observado.

En la primera parte presentamos el estado del arte de la noción de tangente en la enseñanza en Francia. Cabe señalar que las conclusiones de investigadores en didáctica de las matemáticas, algunas hechas desde hace decenas de años, continúan siendo válidas; en particular, el análisis realizado por Castela (1995); nosotros proponemos una prueba que pretende mostrar que, antes del estudio de un capítulo sobre la derivación, la noción de tangente ya representa un problema aun en la preparatoria científica. Eso no es sorprendente, puesto que la única definición que se enseña antes de la preparatoria, es la de tangentes a círculos.

El mayor problema es el estatus que guarda la noción de tangente, es ambiguo en, por lo menos, el segundo año de la preparatoria, a saber, la definición efectiva de la tangente procede de la definición de derivada en un punto; a su vez, la derivada se introduce a partir de un trabajo sobre tangentes. Claramente hay un problema lógico: no se puede usar una noción que no ha sido previamente construida y que da lugar a representaciones poco adecuadas; por eso, y con el fin de solucionar este problema en el programa de estudios, proponemos una enseñanza alternativa de la noción de tangente. Esto no constituye una reforma al programa curricular, sino una visión intermedia dada por las tangentes a las curvas algebraicas.

En la segunda parte, discutiremos los aspectos didácticos e históricos que determinarán las metas en la nueva enseñanza que proponemos. La tercera parte tiene como propósito la introducción y el desarrollo de la noción de tangente a las curvas algebraicas, en relación con los conocimientos anteriores; es decir, las tangentes a circunferencias; finalmente, en la cuarta parte, se propone una nueva introducción a la derivada, apoyándose vigorosamente sobre la noción de tangente tal y como se ha propuesto en este trabajo.

El asunto es tratado tal como se presenta en Francia, pero la mayoría de los puntos examinados son válidos para otros países o regiones, con diversos sistemas de enseñanza.

## 1. La enseñanza de las tangentes

### *En el nivel de la secundaria*

En Francia, la noción de tangente aparece en el grado ocho de la escolaridad básica (tercer año de la secundaria francesa). El objetivo es definir la tangente a un círculo en un punto. Para esta propuesta, estudiamos seis libros de texto que proponen una u otra, de las dos concepciones siguientes:

C1: Una recta que sólo tiene un punto de intersección con el círculo,

C2: Una recta perpendicular al radio en un punto de la circunferencia.

De los seis libros estudiados, tres (*Phare*, *Transmath* y *Bréal*) escogen C1 como definición y expresan C2 como propiedad; uno (*Diabolo*), hace la elección inversa, y los otros dos (*Triangle* y *Dimathème*), sólo institucionalizan C2, aunque C1 está presente como observación o en una actividad de introducción.

Entonces, no hay una definición elegida por unanimidad, pero sí se destaca la importancia de las dos definiciones de la tangente. Se entiende el interés de C2 para el trabajo geométrico, y el vínculo entre C1 y una concepción antigua (véase el Libro III de los *Elementos* de Euclides). En la resolución de las tareas geométricas (propuestas por los libros de texto), sólo hace falta usar C2; C1 únicamente sirve en actividades de introducción en las que prevalece la visualización, misma que la educación de este nivel pretende reducir. En estas actividades de introducción, se esboza la coordinación entre ambas concepciones: la coordinación siempre se basa en la visualización, aun cuando esta se oculta, como ocurre en el libro *Phare*. Dentro del marco de los paradigmas geométricos (Houdement & Kuzniak, 2000, 2006; Kuzniak 2009), C1 se puede interpretar como la definición de la tangente en el paradigma de la Geometría I, y C2 como la definición de la tangente en el paradigma de la Geometría II. En fin, las concepciones C1 y C2 tienen una utilidad local. No se generaliza<sup>1</sup> C2, y C1 sólo se generaliza a las cónicas.

### *El segundo año de la preparatoria científica*

---

<sup>1</sup> Nos limitamos al nivel medio superior: la geometría euclidiana, en la que se considera un único producto escalar.

Nada nuevo se dice sobre el tema durante casi tres años. La noción de tangente se imparte otra vez en el curso sobre las derivadas, en el segundo año de la preparatoria (grado 11). Nuestra elección de estudiar el segundo año de la preparatoria científica es por dos motivos: el primero, es la importancia que tiene la noción de tangente a una curva por ser recurrente en los programas curriculares científicos; la segunda es que así consideramos de inmediato a los estudiantes más interesados en aprender matemáticas.

En los programas curriculares del segundo grado de la preparatoria científica, la tangente sólo aparece en un párrafo, en donde refiere a una definición subordinada a la derivabilidad. Sin embargo, se precisa que la noción de derivada debe ser introducida por una aproximación cinemática o gráfica. En este estudio consideramos la aproximación gráfica, con la posibilidad expresada en los programas curriculares de usar la computación para mostrar “zooms” sobre una curva.

Los contenidos de los libros de texto<sup>2</sup> son muy similares: después de un capítulo sobre la parábola<sup>3</sup> y las funciones cuadráticas, está el capítulo sobre la derivación; para introducirla, se usan, de manera sistematizada, tres aproximaciones: cinemática, gráfica con zooms y gráfica con límites de secantes. Por supuesto que en el curso aparece la definición de las tangentes a las curvas, como el currículo lo prescribe. Aquí surge un problema de progresión: La noción de derivada se apoya fuertemente sobre la noción de tangente, mientras que es a partir de la derivación que se define la tangente.

También hay un capítulo, sin ningún vínculo con el curso sobre las funciones, sobre el círculo, en particular con las ecuaciones de círculo. En él se trabaja la noción de tangente al círculo, con la definición C2 de la secundaria, con la ayuda del producto escalar. En los libros de texto estudiados, casi no se usa la nueva noción de tangente, desarrollada en el capítulo sobre la derivación.

---

<sup>2</sup> Los libros de texto estudiados son: Bréal, Déclit, Fractale, Indice, Math'x y Repère.

<sup>3</sup> A veces, en libros de texto, hay algunos ejercicios sobre las tangentes a una parábola donde se usa la definición C1 de la tangente, pero sin nexo con la derivada.

Después de las definiciones *antiguas* C1 y C2 de la secundaria, los libros de texto presentan dos nuevas definiciones institucionalizadas de la noción de tangente, que son:


C3: límite de las rectas secantes en un punto de la curva, y

C4: recta que pasa por un punto de la curva, y cuya pendiente es valor de la derivada.

La aproximación C3 por límites de rectas, a pesar de que se encuentra en todos los libros de texto, no está explícitamente en los programas curriculares, no permite resolver problemas y se abandonará luego de la introducción del valor de la derivada. Únicamente tiene un valor de ostentación para introducir la tangente con el objetivo de relacionar su pendiente con el límite de la tasa de crecimiento.

C3 parece tener el mismo papel de ostensión que tenía C1 en la secundaria.

La figura 1 da un ejemplo de lo que se encuentra en libros de texto



« En bougeant le point M vers A, la sécante tend vers la tangente. »

Traducción: Al mover el punto M hacia A, la secante tiende hacia la tangente.

(Déclic 1<sup>re</sup> S, p. 71)

Figura 1

franceses:

¡Así la recta (OA) no sería una secante a la curva! Se observa que de forma implícita y local, la palabra “secante” ha cambiado de significado.



*Las concepciones de la noción de tangente*

El capítulo sobre derivación marca una ruptura con los aprendizajes de los años anteriores. La noción de tangente sólo se ha considerado en el caso de círculos. Resulta que la enseñanza de la derivada se apoya sobre concepciones *intuitivas* de la noción de tangente. Más allá de la flagrante carencia de rigor matemático, uno no puede dejar de pensar que las ideas intuitivas de los estudiantes se inspiran en gran parte de las concepciones C1 y C2, que realmente no son adecuadas para el cálculo. Además, la introducción de la derivación se basa sobre C3, que bien pueda estar lejana de las concepciones iniciales de los estudiantes. ¿Por qué aparecería C3 espontáneamente?

En la enseñanza de la tangente en Francia, se observan cuatro definiciones institucionalizadas: dos en el marco geométrico, C1 y C2, y dos en el marco analítico, C3 y C4. No obstante, nunca se trabajan los vínculos entre los dos grupos. La ruptura de los contenidos matemáticos, propios de los marcos en los que se considera la noción de tangente, podría reinterpretarse por la ruptura de las *praxeologías* (Barbé, Bosch, Espinoza & Gascón, 2005; García, Gascón, Ruiz Higuera & Bosch, 2006). En particular, no se enseña que la nueva noción de derivada generaliza la definición de tangente a un círculo.

Los estudiantes en general tienen una concepción parcial, a menudo falsa, de la noción de tangente. Los estudios de Sierpinska (1985) y de Castela (1995), mostraron una gran disparidad de concepciones. En particular la percepción global C1, basada en la tangente al círculo, es frecuente y tenaz<sup>4</sup>.

Retomamos el test central del estudio de Castela (1995), en el que se propone una curva y una recta, y se pregunta si la recta es o no es tangente a la curva. Este nuevo test (cf. anexo A), propone una curva y un punto y pide trazar la tangente si eso es posible; si no lo es, pide aclarar el porqué. Se aplicó el test en tres clases de segundo año de preparatoria científica, en tres ciudades diferentes, con una población total de 88 estudiantes. La

---

<sup>4</sup>Esta percepción se puede reforzar por la propuesta de algunos libros de texto, que proponen determinar las tangentes a las parábolas antes del capítulo sobre la derivación.

aplicación duró 20 minutos y tuvo lugar en octubre de 2009, previo a cualquier enseñanza de la derivada.

Los primeros resultados muestran que existe un gran número de estudiantes que tienen concepciones erróneas sobre la noción de tangente (cf. Anexo B):

- 33% tiene concepciones relacionadas con el círculo (C2); o bien escriben que es imposible trazar una tangente porque no es un círculo, o bien trazan una perpendicular a un radio imaginario;
- 27% tiene una concepción global (C1);
- 28% declara imposible el trazar una tangente a un trozo rectilíneo;
- 27% corresponde a diversos casos particulares.

Por supuesto que estas concepciones no se excluyen mutuamente, y a menudo se observan asociaciones y hasta contradicciones; a pesar de ello, más de la mitad de los estudiantes (51%) tienen concepciones de la noción de tangente acorde a la enseñanza secundaria (C1 ó C2). Sólo el 22% de los estudiantes tienen las concepciones que parecen adecuadas al marco gráfico. La introducción de la derivada a través de las tangentes, únicamente puede ser eficaz para uno de cada cinco estudiantes en clases científicas.

Se observa que ningún estudiante muestra espontáneamente la concepción C3 por el límite de tangentes. A lo más, se acercaría a ella un estudiante que traza una secante con dos puntos próximos (cf. Anexo B-e). Se nota que el uso del término “secante” es muy problemático. Además del problema señalado arriba, a propósito de la figura 1, si  $M$  es un punto de la curva próximo de  $K$ , ¿se puede decir que  $KM$  es una secante?

Aun cuando el caso de una curva con segmento rectilíneo no es considerado, en los libros de texto, la aproximación dada por C3 no puede sino reforzar el obstáculo de la tangente a una curva de este tipo. Desde el punto de vista matemático, como aproximación a la noción de derivada, se usa la noción de tangente, pero dado que ésta no es definida, se considera el límite en el espacio proyectivo real de dimensión uno. Tal fuga en adelante no es razonable, y debemos constatar que la aproximación C3 no es pertinente en el problema que nos ocupa.

Así, no solamente 4/5 de los estudiantes considerados no tiene concepciones adecuadas para aprovechar la propuesta de enseñanza de

introducción al cálculo, sino que además se usa una nueva concepción de C3 que refuerza los obstáculos.

Entonces, debemos resolver problemas importantes, y se tienen que resolver antes de sumergir a los estudiantes en el gran baño del cálculo. Con este objetivo partiremos de lo esencial de la concepción C1,

presentada en la secundaria, y propondremos un proceso didáctico cuya culminación será C4. En este proceso, usaremos una concepción intermedia que permitirá dar una existencia matemática consistente a la noción de tangente, que generaliza C1 y C2. Por las numerosas razones señaladas arriba, dejaremos de lado la definición C3.

## **2. Metas para una enseñanza alternativa de las rectas tangentes**

Antes de explicitar nuestra propuesta o alternativa para la enseñanza de la recta tangente y de la derivada, presentaremos los tres enfoques que guiaron este proceso.

### **El proyecto AHA**

Para resolver los problemas del aprendizaje del cálculo y del análisis matemático, se propone tomar como base el proyecto AHA - Aproximación Heurística del Análisis - (Groupe AHA, 1999), para repensar la enseñanza del cálculo en su globalidad. Se trata de un ambicioso proyecto propuesto por investigadores en didáctica, que en 1999 publicaron un libro de texto y una guía metodológica.

Con respecto a la enseñanza de las tangentes y conforme con las investigaciones didácticas señaladas en la sección 1, los autores del proyecto proponen un trabajo sobre esta noción antes de entrar en la enseñanza del cálculo. Se apoyan en la parte de grado 1 (o parte afín) en 0 de un polinomio: Consideramos el polinomio  $f(x) = y_0 + y_1x + x^2$ ; la ecuación de la tangente en  $(0, y_0)$  a su gráfica es  $y = y_0 + y_1x$ . Esta técnica de obtención de las tangentes no se generaliza a curvas más generales ni a puntos de abscisa diferentes de 0. Se trabaja con la noción de tangente, pero la noción aún no tiene su definición matemática.



La única expresión que se menciona, sin definirla matemáticamente, es “una recta que roza con la curva”<sup>5</sup>. Además, la relación con una aproximación afín no es tan evidente, si no se dan precisiones sobre el significado del símbolo “ $\approx$ ”, muchas aplicaciones afines cumplen con la condición escrita en AHA (1999, página 56):

$1 - x \approx 1 - x + x^2 + x^3$  en la vecindad de cero. Otros problemas se encontrarían al usar la “mejor aproximación afín”, como lo nota Perrin-Glorian (1999). Excepto por este elemento puntual relacionado con la

noción de tangente, el proyecto es de gran interés y nuestras inquietudes son muy similares a las del proyecto AHA:

- necesidad de la resolución de problemas: aun cuando no aparece en este artículo, la consideramos como esencial para entrar en un proceso de aprendizaje;
- un trabajo intermedio en el marco algebraico: eso es el corazón de nuestra propuesta (cf. La sección siguiente);
- necesidad de abandonar la concepción global C1, al considerar un polinomio de grado 3 (Schneider 1991, 2001): nos inspiraremos en eso;
- apoyo sobre el desarrollo histórico al situar los límites en el centro del proceso (AHA 1999): también nos apoyaremos sobre la historia de las matemáticas, pero tomaremos una referencia no considerada por los autores del proyecto AHA.

### *Los juegos local/global y cálculo exacto/cálculo aproximado*

Maschietto (2002, 2004), ha organizado secuencias de enseñanza en las que se usan zooms sobre una curva. Esto evidencia la importancia del juego inducido entre los puntos de vista local y global.

Presentamos un primer ejemplo de zooms en el que se explotan las potencialidades de software de traza de curvas – aquí se usó *GeoGebra* – para la curva de ecuación  $y = 2x^3 - x^2 - x + 1$  en el punto  $A(1,1)$ .

---

<sup>5</sup> En el caso peculiar de una curva con un trozo rectilíneo que ya señalamos, no se usará el verbo “rozar”.




Figura 2-a  
rejilla .5x.5




Figura 2-b  
rejilla .05x.05




Figura 2-c  
rejilla .02x.02




Figura 2-d  
rejilla .01x.01

Después de nueve zooms centrados en el punto marcado en la figura 2-a, aparece una recta en la figura 2-d, una propiedad de las curvas que Maschietto (2002, 2004) llama *micro-linealidad*.

Así se puede determinar, en el punto señalado, la ecuación de la tangente como una de las tareas dadas a los estudiantes por Maschietto. El software permite también trazar la tangente de forma satisfactoria: se traza la recta punteada entre el punto considerado y otro punto marcado por una cruz (figura 2-d').

Luego, por zooms inversos, se regresa a la ventana inicial, donde ahora aparecen a la vez la curva y su tangente (véanse las figuras 2-d' a 2-a').



Figura 2-d'  
rejilla .01x.01



Figura 2-c'  
rejilla .02x.02




Figura 2-b'  
rejilla .05x.05




Figura 2-a'  
rejilla .5x.5

Este juego entre lo local y lo global es esencial según Maschietto para entender la noción de tangente. Una tangente es un objeto global (véase la figura 2-a'), cuya definición es local (véase la figura 2-d'). Con respecto a eso, es imprescindible una cita de Perrin-Glorian (1999), en su conclusión sobre las aproximaciones afines de las curvas: “La tangente ¡verdaderamente es una noción local! [...] El único uso verdaderamente adecuado de la computadora para hacer aparecer de forma natural la tangente, sería el hacer zooms hasta ver la curva cambiarse en recta<sup>6</sup>.”

Este juego entre lo local y lo global es también esencial para entrar en el cálculo, como lo recomienda la Comisión de Reflexión sobre la Enseñanza de la Matemática en Francia, dirigida por Kahane (2002). Por otro lado, se subraya la importancia de los órdenes de magnitud en el cálculo numérico, mismos que constituyen un nuevo juego, entre cálculo exacto y cálculo aproximado.

Además de los zooms que usaremos plenamente, nos apoyaremos sobre estos dos juegos: global/local y cálculo exacto/cálculo aproximado.

### *Una perspectiva histórica*

La perspectiva histórica permite delimitar mejor lo que puede ser una propuesta alternativa para la enseñanza de las tangentes y de la derivación. Cuando se ponen frente a frente el encadenamiento de las nociones enseñadas y de las nociones según su aparición en la historia, se observa que falta una etapa del desarrollo histórico: los trabajos de Descartes. Descartes (1673), define una clase de curvas para las que existe un método para determinar las tangentes; eso es un avance decisivo, que va mucho más allá de la pequeña clase de las cónicas.

También el método de Fermat permite encontrar fácilmente las tangentes a las curvas algebraicas; aunque es un método es difícil de explicar, puesto que ya se encuentra en gran parte del el análisis. En efecto, la “*adigualación*” consiste en hacer como si la curva y su tangente estuvieran

---

<sup>6</sup> Nota del traductor (F. Pluvinaige): Perrin-Glorian usa el condicional, pero este zoom ya había sido publicado en libros de texto, como en el de segundo año de preparatoria del IREM de Strasbourg (1982, *Mathématiques : Analyse et Statistiques, I<sup>res</sup> S et E*, Istra, Paris, p. 128).

confundidas, y no es mera casualidad si el método se adapta a ciertas curvas trascendentes, como la cicloide, al contrario del método de Descartes (Cercle d'Histoire des Sciences, 1999). Usando los términos de Chevallard (1999), podemos decir que el método de Fermat es una *técnica* algebraica cuya *tecnología* es analítica. Entonces es un método que da los resultados esperados, pero que no permite entender por qué funciona y tampoco permite dar una definición conveniente de la tangente a una curva. Y Fermat, no da una clase de curvas a la que su método permita dar tangentes.

Por el contrario, el método de Descartes es completamente algebraico y fácil de entender. En lo esencial, el método se apoya en la concepción antigua C1, pero desde el punto de vista local, lo veremos en la sección siguiente.

No desarrollaremos los enfoques de Newton y Leibniz, que permitieron el surgimiento del cálculo (véase por ejemplo Barbin, 2006). Sólo indicaremos algunos puntos sobre los que nos apoyamos.

Leibniz se sitúa en oposición a Descartes, al criticar el rango débil de las meras curvas *geométricas*. Sin embargo Leibniz se inscribe en la lógica cartesiana, al querer definir las tangentes para una amplia clase de curvas. Específicamente, la determinación de las tangentes muestra también similitudes entre los trabajos de Descartes y de Leibniz. Ambos se fundamentan sobre el mismo principio: por un punto de una curva dada pasan rectas que constituyen un haz de rectas concurrentes, la tangente es una de ellas y tiene una propiedad particular: es el corazón de los trabajos tanto de Leibniz como de Descartes sobre las tangentes. Todo el problema es un asunto de caracterización y de selección de una recta dentro de las secantes donde, por supuesto, la naturaleza de la curva juega un rol central. Aquí vale la pena destacar que se trata de una verdadera secante; es decir, una recta que pasa por el punto en el que se quiere determinar la tangente. En particular, la aproximación por *el límite de secantes*, presente en todos los libros de texto actuales, parece completamente ausente de los trabajos del siglo XVII (aun cuando algunas concepciones de Newton (1740), se acercan a ella). Además, la caracterización de una recta dentro de las secantes permite evitar uno de los problemas que resultan de la concepción C3, problema mencionado por Sierpinska (1985) citando a estudiantes: “Cuando se llegue al punto *A*, sólo se tendrá un punto, y por un punto podemos trazar muchas rectas.”

En el apartado que sigue, proponemos la consideración del problema desde la perspectiva de: sólo hay un punto en el caso de la tangente, lo que induce la caracterización de la tangente en el haz de rectas concurrentes.

### 3. Las tangentes a las curvas algebraicas

Antes de entrar en el cálculo, en este apartado vamos a construir una noción de tangente que va mucho más allá de los meros círculos, sin restringirse a las cónicas como se hizo, por ejemplo, en Italia y Grecia. Se explota la idea expresada por Ibarra y Velásquez (2007): primero hacer emerger los conceptos en el marco algebraico, antes de entrar en el marco analítico.

La elección de las curvas algebraicas no se debe al azar, porque tenemos métodos simples de obtención de las tangentes, como el método de Descartes. Al inicio, el método consiste en buscar un círculo tangente a una curva. Pero es más sencillo buscar directamente una recta, así como ya en 1849 lo propuso Florimond de Beaune (Barbin, 2006, p. 216). Es sencillo entender la técnica al mismo tiempo de usarla. En particular, no hay ninguna noción nueva para incluir en el currículo. Se usa plenamente el álgebra enseñada<sup>7</sup> hasta el grado 11: ecuaciones de curvas, cálculo algebraico, ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones.

Damos ejemplos detallados de tres aspectos principales de nuestra propuesta; en el Anexo C aparecen otros ejemplos, que ilustran el alcance del método de Descartes.

#### *El método: El ejemplo de la función cuadrado*

Consideremos una parábola, la curva algebraica más sencilla después de la recta. Para determinar la tangente a  $y = x^2$  en un punto  $A(a, a^2)$ , caracterizamos la tangente dentro de las rectas que pasan por  $A$ . Entonces, consideramos las secantes en  $A$  que tienen una ecuación de la forma  $y = k(x-a) + a^2$ .

---

<sup>7</sup> Sin embargo, sería preciso insistir sobre ciertas nociones, como las ecuaciones de curvas – sin limitarse en los círculos – y la factorización por  $(x - a)$  de un polinomio que tiene  $a$  como raíz.



1. Se escribe el sistema de las dos ecuaciones para identificar los puntos de intersección:

$$y = x^2 \qquad y = k(x-a)+a^2$$

2. Se escribe la ecuación que da las abscisas de los puntos de intersección:

$$x^2 = k(x-a)+a^2$$

Puesto que  $x=a$  es una solución, se factoriza  $(x-a)$ :

$$(x-a) \cdot (x+a-k) = 0$$

3. Se obtienen las soluciones  $x = a$  y  $x = k-a$ , que corresponden a dos puntos de intersección entre la curva y una recta pasando por  $A$  (cf. figura 3). Dado que se quiere la tangente, hace falta que sólo se tenga un punto de intersección. Por identificación de los puntos obtenidos, resulta que  $a = k-a$ , sea  $k = 2a$ .

Entonces la ecuación de la tangente es:  $y = 2a(x-a)+a^2$ .




Figura 3




Figura 4

Antes de ir más adelante, hacemos algunas observaciones:

- El ejemplo de la parábola se apoya en la noción C1 de la secundaria, por lo que no requiere de parte de los estudiantes ninguna nueva concepción de las tangentes. No hay nada nuevo, todas nociones necesarias se enseñan en el grado 10.
- Se obtiene la tangente al buscar una solución doble.
- La escritura como funciones de las rectas que pasan por  $A$ , tiene el interés de evidenciar que sólo hace falta determinar el parámetro  $k$  para encontrar la tangente dentro de las rectas del haz.
- La forma funcional presenta la desventaja de no incluir las rectas *verticales*. Pero se puede observar que el punto de intersección de la parábola con la recta de ecuación  $x = a$  no es doble, lo que justifica *a posteriori* la forma funcional. Para facilitar la comprensión, será preferible reconsiderar este hecho en el momento de determinar las tangentes a los círculos.
- Se puede reducir el tratamiento del 3, porque corresponde a anular el segundo factor cuando  $x = a$ . Con esta observación, el método sigue eficaz para curvas de grado 3 ó superior, que no dan certeza de obtener todas las soluciones.

*Localización de la mirada: el ejemplo de la función cubo*

Generalmente, las curvas de la forma  $y=f(x)$ , donde  $f$  es un polinomio, conducen siempre a la búsqueda de una solución a lo menos doble<sup>8</sup>. Por otro lado, se obtiene la fórmula de la derivada de un polinomio (véase el Anexo C-a) En particular, para una ecuación como  $y = x^3$ , la técnica algebraica es idéntica:

---

<sup>8</sup> Por ejemplo, en el caso considerado de la función cubo, cuando  $a=0$ , el punto de intersección corresponde a una solución triple.

1. Sistema:  $y = x^3$  ;  $y = k(x-a)+a^3$ ,
2. Ecuación y factorización:  $(x-a) \cdot [x^2+ax+a^2-k] = 0$ ,
3. Anulación en  $x = a$  del segundo factor:  $a^2+a \cdot a+a^2-k = 0$ ,  
y obtención del coeficiente directo de la tangente:  $k = 3a^2$ .

Aun cuando se podría determinar, en este caso, todas las soluciones de la ecuación, se entiende el interés en reducir el 3 como lo proponemos, al anular el segundo factor sin buscar todos los puntos de intersección. Además, eso evita la consideración de soluciones imaginarias. En el aula, se tendría que guiar a los estudiantes para la factorización, y el parámetro  $a$  debería tener un valor numérico.

Según que lo ha señalado el grupo AHA, el ejemplo estudiado es importante: se muestra que la tangente puede recortar la curva en otro punto. El tercero de los puntos de intersección, se obtiene al prolongar el trazo de la tangente sobre la figura 4 (véase también el Anexo B-b). Así la propiedad que permite definir y obtener las tangentes es local, lo que autoriza al estudiante a desprenderse de la concepción rudimentaria C1.

En algunos países, como Italia o Grecia, este tipo de procedimiento se enseña para las cónicas; como consecuencia, los estudiantes tienen una conducta automatizada: Escribir el sistema y anular el discriminante  $\Delta$  de la ecuación que resulta del sistema, sin factorización (Maschietto, 2004). Pero esta técnica tiene un campo de aplicación muy limitado, dado que sólo se aplica a las curvas algebraicas de grado no mayor que 2. Y es sumamente importante no limitarse a las cónicas, puesto que con estas curvas, la concepción global C1 es válida. Hace falta considerar diferentes casos para ampliar las perspectivas.

### *El caso del círculo o el problema de la generalización*

Presentamos aquí el caso del círculo como una técnica importante para la enseñanza. La complejidad del caso genérico viene de la necesaria distinción de los casos particulares de los puntos en los que las tangentes son *verticales*. Por eso estudiamos en dos etapas el caso de un círculo centrado en el origen de los ejes del plano cartesiano. Se trata de determinar la tangente al círculo de centro  $O$  y de radio  $r$  en el punto  $A(a,b)$  (cf. figura 5). A continuación se usa plenamente la identidad  $a^2+b^2=r^2$ .

1. Sistema:  $x^2+y^2 = a^2+b^2$ ;  $y = k(x-a)+b$
2. Ecuación y factorización:  

$$x^2+[k(x-a)+b]^2 = a^2+b^2 \Rightarrow (x-a) \cdot [x+a+k^2(x-a)+2kb] = 0$$
3. Anulación del segundo factor:  $a+a+k^2(a-a)+2kb = 0 \Rightarrow k = -a/b$ .

Excepto el inicio, con la substitución de la expresión de  $y$  en la ecuación del círculo, todo es lo mismo a los casos precedentes. Una vez encontrado el valor de  $k$ , es decir la tangente, se puede probar el teorema visto en la secundaria.

Con el producto escalar  $\vec{OA} \cdot \vec{u}$ , donde  $\vec{u} = (1, k)$  es un vector director de la tangente en  $A$ , se demuestra fácilmente que el radio y la tangente son ortogonales.




Figura 5

Es así que se presenta una perspectiva de generalización.

No obstante, el método parece defectuoso cuando  $b = 0$ . Pero acabamos de probar que ninguna recta, no paralela al eje de las ordenadas, es tangente al círculo en el punto  $B$ . Por eso, si existe una tangente, sólo puede ser la recta de ecuación  $x = a$ . Aplicamos otra vez el método:

1. Sistema:  $x^2+y^2 = a^2$ ;  $x = a$
2. Ecuación y factorización:  $a^2+y^2 = a^2 \Rightarrow y^2 = 0$

El 3 es inútil aquí, se obtiene un único punto doble de intersección entre la recta considerada, de ecuación  $x = a$ , y el círculo: entonces es la tangente.

*Definición de una tangente. El caso particular de las tangentes a las rectas*

El caso particular precedente –las tangentes *verticales* a los círculos– puede parecer abstracto<sup>9</sup>, pero es importante por dos razones: la primera es que

<sup>9</sup> Al usar la caracterización geométrica de las tangentes, independiente del sistema de ejes, no sería preciso considerar este caso.

justifica el método de búsqueda de las tangentes que se apoya sobre las ecuaciones funcionales de las secantes, dejando voluntariamente a un lado las rectas *verticales*; la segunda es que pone énfasis sobre la importancia de la obtención de un punto de intersección de orden al menos 2. Luego es posible un retorno al caso de la parábola, cuya intersección con una recta paralela a su eje de simetría sólo da lugar a un punto simple.

Ahora se puede dar la definición de la tangente que emerge de este primer trabajo algebraico: *Una tangente en un punto de una curva es una secante que tiene con la curva en este punto una intersección de orden de multiplicidad al menos 2.*

El método presentado se puede aplicar a todas las curvas algebraicas. Pero la solución no necesariamente es doble, y se pueden obtener varias soluciones para el parámetro  $k$ , lo que es el caso en puntos múltiples o con semitangentes. El Anexo C da algunos ejemplos. A pesar del amplio alcance del método<sup>10</sup>, estudiar curvas más complejas de esta manera algebraica no nos parece útil. Es cierto que el estudio puede ser interesante y rico, pero hace falta tener en cuenta el objetivo: Queremos preparar el terreno para una introducción del cálculo y no desarrollar una enseñanza paralela. En particular, si la definición de la tangente que acabamos de dar es suficiente para el trabajo proyectado, seguir estudiando las curvas en el marco algebraico necesitaría esta adaptación: *Las secantes en un punto  $A$  de una curva algebraica, tienen en  $A$  con la curva una intersección del mismo orden de multiplicidad  $v$ , excepto a lo más  $v$  de ellas, que tienen en  $A$  con la curva una intersección de orden de multiplicidad estrictamente superior a  $v$ . Son estas últimas las que nombramos tangentes a la curva en  $A$ .* En Anexo D se encuentra una justificación de este resultado.

Al contrario, como lo hemos observado en el apartado 1, es preciso un trabajo específico sobre la tangente a una *curva rectilínea*. Usamos el método para encontrar la tangente a la *curva* de ecuación  $ax+by+c=0$  en el punto  $A(x_A, y_A)$ . Para evitar considerar dos casos, suponemos aquí que  $b \neq 0$ .

1. Sistema:  $ax+by+c=0$ ;  $y=k(x-x_A)+y_A$
2. Ecuación (obtenida por substitución como en los casos de círculos):

$$ax+bk(x-x_A)+by_A+c=0$$

<sup>10</sup> Determinar  $k$  es obtener las raíces de un polinomio en  $k$ . En los casos sencillos considerados, esta determinación siempre es posible.



Dado que  $by_A + c = -ax_A$ , se obtiene:

$$ax + bk(x - x_A) - ax_A = 0 \Rightarrow (x - x_A) \cdot (a + bk) = 0$$

3. Anulación del segundo término:  $a + bk = 0 \Rightarrow k = -a/b$ .

La anulación del segundo factor para  $x = x_A$  es algo rara, puesto que  $x$  no aparece en este factor y la ecuación desaparece por este valor de  $k$ . Pero al aplicar el método, supimos determinar una tangente a una recta. Notemos que no se encuentra aquí ninguna adaptación del método. Por ese motivo la aclaración es muy diferente de los demás casos considerados: se pasa de un punto de intersección simple, en el caso de las secantes, a una infinitud de puntos de intersección en el caso de la tangente, cuya multiplicidad queda misteriosa, porque el grado  $-\infty$  del polinomio nulo no aclara nada. Se trata de un caso muy particular.

Por supuesto que el caso de las tangentes a las rectas se debe de considerar después de un primer trabajo sobre las funciones sencillas, como son polinomios, funciones racionales, etcétera.

#### 4. Una introducción al cálculo

Después del trabajo algebraico sobre la noción de tangente, el contexto se presenta como sigue:

- La tangente es matemáticamente consistente.
- La visión se ha convertido en mirada local.
- Sólo se tiene que determinar un parámetro para caracterizar la ecuación de una tangente dentro de las secantes.

Podemos apoyarnos sobre estos tres elementos para llegar al límite de la tasa de crecimiento. En este apartado exponemos los grandes rasgos de una posible progresión que conduce al número derivado y a los nexos entre derivada y tangente.

Retomando la idea de la Comisión Kahane (2002), proponemos un cambio de marco al considerar el enfoque del cálculo aproximado. Se puede, por ejemplo, presentar a los estudiantes una curva trazada en el plano cartesiano y pedirles la ecuación de la tangente en un punto dado<sup>11</sup>. Para la apropiación de la tarea por los estudiantes, el primer trabajo se puede hacer con papel y lápiz.

<sup>11</sup> Hace falta señalar que los libros de texto presentan de manera muy puntual este tipo de tarea, para el cálculo aproximado del número derivado.

Para ilustrar esto, para la curva de la función seno en  $x = 1$ , se traza la tangente de la manera más precisa que se puede. Luego se halla su ecuación funcional ayudándose de las coordenadas (véase la figura 6, con ejes graduados en cm para simplificar la tarea). Se obtiene  $k \approx 0,75/1,3 \approx 0,58$ .




Figura 6

Lo importante aquí es el procedimiento de determinación de  $k$ , y en particular el uso del triángulo rectángulo. La técnica es muy aproximativa, porque se trata de trazar una tangente “a la vista” y luego de medir los catetos de un triángulo rectángulo, para finalmente calcular la pendiente de la tangente.

Una vez planteado el problema del carácter aproximado de la técnica, es posible usar la computación para mejorar la precisión de los resultados. Los zooms nos permiten trazar rectángulos cada vez más pequeños, así que alcanzamos una precisión cada vez mayor para  $k$ , puesto que la precisión el trazo de la tangente aumenta (la computación se encarga por completo de la gestión del cálculo de  $\Delta y/\Delta x$ ).

La adaptación de los triángulos rectángulos sucesivos a los zooms constituye una fuerte diferencia con el problema de la desaparición de estos triángulos, evidenciada por Schneider (1991), en una concepción de tipo C3.

La estimación por el cociente  $\Delta y/\Delta x$  viene más precisa a lo largo de los zooms, hasta que la curva coincide con su tangente (Figura 7-c, semejante a las figuras 2-d y 2-d'). En los tres casos de las figuras 7, uno se acerca del valor exacto de la pendiente de la tangente ( $\cos(1) \approx 0,540302$ ), al jugar también con la precisión de los valores proporcionados por el software.

Otras veces observamos que este método tiene sus limitaciones porque, una vez obtenida en la pantalla la representación de la curva por una recta (Figuras 2-d, 2-d' y 7-c), zooms suplementarios no mejoran la precisión. Pero el principio de hacer zooms para tener un valor más preciso de la pendiente  $k$  permite vincular el problema de la precisión en la obtención del parámetro  $k$  con el juego local/global.



Figura 7-a  
 $k \approx 0,75/1,2$




Figura 7-b  
 $k \approx 0,137/0,256$




Figura 7-c  
 $k \approx 0,00196/0,00363$

Sobresalen los dos principios analíticos siguientes:

- El triángulo característico de Leibniz aparece y muestra que se puede considerar localmente qué curva y qué tangente se confunden.
- Afinar valores aproximados para determinar un valor exacto es, en su esencia, el principio del límite.

Del segundo, resulta que el valor exacto del parámetro  $k$  es el *límite* del cociente  $\Delta y/\Delta x$ , que aparece por el primero como límite de la tasa de crecimiento en el punto considerado.

Entonces se llega al número derivado, lo que era el objetivo. Pero se tiene mucho más:

- El vínculo entre tangente y derivada es una consecuencia de la construcción, cuanto menos en el caso de las curvas algebraicas, y no una afirmación cuyo rigor matemático sea dudoso.
- Las derivadas de los polinomios, y otras funciones sencillas, están disponibles antes de la enseñanza de la noción de límite (véase Anexo C-a, C-b et C-c).

Finalmente, notamos que a las curvas no algebraicas les corresponde una verdadera generalización. En particular en el caso de nuestro ejemplo, el sistema  $y = \sin x$  ;  $y = k(x-1) + \sin(1)$  produce una ecuación que no se puede explorar por el álgebra

## Conclusión

La consideración de las curvas algebraicas antes de empezar el cálculo es esencial, porque permite tener a disposición desde el inicio una verdadera noción de tangente. La progresión propuesta hace una clara distinción entre dos etapas: 1- las tangentes, 2- las derivadas; mientras la enseñanza tradicional introduce ambas nociones a la vez. Además, aunque no es un argumento didáctico, la progresión respeta el desarrollo histórico, así que no vamos en terreno desconocido. Un estudio ecológico de la noción de tangente en Francia (Chevallard, 2001), permitiría afinar el estado del arte del apartado 1. Esto nos parece importante antes de experimentar nuestra propuesta. Pero también tenemos que tomar en consideración el problema de la epistemología de los profesores: conocen poco de esta concepción alternativa de la noción de tangente y frecuentemente la consideran con muchas reservas, así que lo constatamos al impartir conferencias en “lycée” (equivalente en Francia del CCH en México). La enseñanza propuesta se puede impartir desde el primer año de preparatoria, pero quizás sería preferible reservarla para el segundo año, antes de estudiar verdaderamente el cálculo durante el último año.

Podríamos desarrollar la aproximación algebraica de las curvas al indagar el radio de curvatura. Se puede trabajar la potencia de un punto de la curva respecto a un círculo tangente, cuyo centro, pues, se sitúa sobre la normal. El círculo osculador se obtiene de manera semejante a la tangente, al factorizar y anular un segundo factor. El orden 2 y el estudio de la convexidad están al alcance. Desafortunadamente, el tratamiento algebraico es más largo, aun en el caso sencillo de una parábola.

En este texto no desarrollamos las aplicaciones de la noción de tangente, debido a nuestro enfoque sobre los nexos fuertes entre tangente y derivada. Estos nexos quedan ocultos en la enseñanza, mientras que pueden proporcionar una base firme. Pero todo lo anterior, sólo tiene sentido si la noción de tangente es motivada, si permite realmente la resolución de problemas. Es importante para la entrada en el proceso que proponemos, aun cuando, ulteriormente, la derivación constituirá una herramienta más potente. Para ampliar esta idea, el lector se podrá referir al proyecto AHA y a Vivier (2006).

Por último, no se puede soslayar la cuestión subyacente en muchos estudios y que a penas rozamos en este texto: *¿Qué es una curva?* Esta cuestión ocasiona muchas dificultades a los estudiantes de todos los niveles. Es difícil, porque exige no una respuesta, sino varias.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Groupe AHA, (1999). *Vers l'infini pas à pas, Approche Heuristique de l'Analyse – Guide méthodologique*, De Boeck Wesmael.

ANDREU IBARRA, M., & RUESTRA VELAZQUEZ, J. A., (2007). Et si nous en restions à Euler et Lagrange ? Mise à l'essai d'un enseignement d'analyse à des étudiants non mathématiciens en début d'études supérieures, *Annales de didactique et de sciences cognitives*, Vol. 12, IREM de Strasbourg, France.

BARBIN, E., (2006). *La révolution mathématique du XVII<sup>e</sup> siècle*, Ellipses.

BARBÉ, Q. BOSCH, M., ESPINOZA, L., & GASCÓN, J. (2005). Didactic restrictions on the teacher's practice, The case of limits of functions in Spanish high school, *Educational Studies in Mathematics*, 59.

CASTELA, C., (1995). Apprendre avec et contre ses connaissances antérieures, *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 15(1).



CERCLE D'HISTOIRE DES SCIENCES – IREM DE BASSE-NORMANDIE (1999). *Aux origines du calcul infinitésimal*, Ellipses.

CHEVALLARD, Y. (1999). L'analyse des pratiques enseignantes en théorie anthropologique du didactique, *Recherches en Didactique des Mathématiques*, 19(2).

CHEVALLARD, Y. (2001). Organiser l'étude – Ecologie et régulation, *Actes de la 11<sup>e</sup> école d'été de didactique des mathématiques, 21-30 août 2001*, Corps.

DESCARTES, R., (1637). *La géométrie*, Editions Jacques Gabay, réédition de 1991. Téléchargeable à <http://gallica.bnf.fr>.

GARCIA, F. J., GASCON, J., RUIZ HIGUERAS, L. & BOSCH, M. (2006). Mathematical modelling as a tool for the connection of school mathematics, *ZDM*, 38(3).

HOUEMENT, C., KUZNIAK, A., (2000). Formation des maîtres et paradigmes géométriques, *Recherche en Didactique des Mathématiques*, 20(1).

HOUEMENT, C., KUZNIAK, A., (2006). Paradigmes géométriques et enseignement de la géométrie, *Annales de didactique et de sciences cognitives*, 11.

KAHANE, J.-P., (2002). *Commission de réflexion sur l'enseignement des mathématiques*, Odile Jacob.

KUZNIAK, A. (2009). *Un essai sur la nature du travail géométrique en fin de la scolarité obligatoire en France*, in Chypre et France, Recherche en didactique des mathématiques, GAGATSI, A., KUZNIAK, A. DELIYIANNI, E. & VIVIER, L. éditeurs. Lefkosia, Chypre 2009.

MASCHIETTO, M., (2002). Quelques éléments de l'étude de la transition algèbre.analyse au lycée, *Actes de la 11<sup>e</sup> école d'été de didactique des mathématiques 21-30 août 2001*, la Pensée Sauvage éditions.

MASCHIETTO, M., (2004). Le jeu entre point de vue local et point de vue global en analyse : une ingénierie didactique à visée diagnostique au niveau première, *Actes du colloques de Mulhouse 8-9 mars 2002*, IREM de Strasbourg.

NEWTON, I. (1740). La méthode des fluxions, et les suites infinies, par M. le chevalier Newton, traduction de Buffon. Téléchargeable à <http://gallica.bnf.fr>.

PERRIN-GLORIAN, M.-J., (1999). La tangente est-elle vraiment la droite qui approche le mieux la courbe au voisinage d'un point ?, *Repères IREM* 34.

SCHNEIDER, M., (1991). Quelques difficultés d'apprentissage du concept de tangente, *Repères IREM* 5.

SCHNEIDER, M., (2001). Praxéologies didactiques et praxéologies mathématiques – à propos d'un enseignement des limites au secondaire, *Recherche en Didactique des Mathématiques*, 21(1.2).


SIERPINSKA, A. (1985). Obstacles épistémologiques relatifs à la notion de limite, *Recherche en Didactique des Mathématiques*, 6(1).

VIVIER, L. (2006). *La Géométrie analytique*, Le Pommier, collection *Quatre à Quatre*.

**Anexo A - El test aplicado**

Para cada una de las curvas, ¿es posible trazar una tangente en el punto  $K$ ?


- si se puede, trace esta tangente ;
- si no, aclare brevemente el porqué (escriba al lado de la curva).

Curva n°1  
n°4



Curva n°2




Curva n°3




Curva

Curva n°5  
n°8


Curva n°6




Curva n°7



Curva



Curva n°9




En el cuestionario, las curvas estaban distribuidas sobre dos páginas (curvas 1 a 4 y curvas 5 a 9). Arriba aparecen reproducidas en reducción al 50%. Para evitar influencias entre estudiantes vecinos, el mismo cuestionario se había diseñado con un punto  $Z$  sobre curvas ordenadas de manera diferente (1-3-5-6-8 en la primera página y 7-2-4-9 en la segunda). Estas “curvas  $Z$ ” difieren poco de las “curvas  $K$ ” (por simetrías o rotaciones), excepto la homóloga de la curva 8, que es una curva en forma de ocho (la del Anexo C-d).

Las curvas n°2 y n°8 no se toman en cuenta en los porcentajes dados en el apartado 1.



**Anexo B – Algunos ejemplos de concepciones *intuitivas* de los estudiantes**

a- Concepciones relacionadas con el círculo (C2)



No se puede trazar la perpendicular que pasa por Z.


Courbe n°1




No, esto no es un círculo

Non, ce n'est pas un cercle

b- Concepción global (C1)



No, es imposible porque la tangente de K pasa por 2 puntos




la courbe n°5 n'a pas de tangente car elle coupe la droite en plusieurs points

La curva n°5 no tiene tangente porque corta la curvas en varios puntos.




c- Concepciones C1 y C2 simultaneas



Non  
ce n'est pas  
possible car la  
tangente coupe la  
courbe en 2  
points, sur la m  
me courbe.

No es posible, porque la tangente cortaría la curva en 2 puntos sobre la misma curva

d- Imposibilidad de trazar una tangente a un trozo rectilíneo



Non, car K est sur une droite.


No, puesto que K está sobre una recta



Impossible car Z est sur une courbe qui est un segment.

Imposible porque Z está sobre una curva que se parece a un segmento


non, car Z se trouve sur une partie de la courbe qui est une droite (représentée par des crochets).



No, porque Z se sitúa sobre una parte de la curva que es una recta (representada por corchetes)

e- La concepción cercana de C3

La tangente se traza a partir de dos puntos cercanos de  $Z$  y situados de cada lado del punto  $Z$  (cf. Sierpinska, 1985).



**Anexo C – Algunos casos de obtención de tangentes**

a- Fórmula de derivación de los polinomios

Determinemos las tangentes a la curva representativas de un polinomio  $f$ :

1. Sistema:  $y = f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$  ;  $y = k(x-a) + f(a)$
2. Ecuación y factorización:  $a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 = k(x-a) + f(a)$   
 $\Rightarrow (x-a) \cdot [a_n(x^{n-1} + x^{n-2}a + \dots + xa^{n-2} + a^{n-1}) + \dots + a_2(x+a) + a_1 - k] = 0$

La anulación del segundo factor para obtener un punto de intersección de orden al menos 2, produce la expresión esperada:

$$k = a_n(na^{n-1}) + \dots + a_2(2a) + a_1 = n a_n a^{n-1} + \dots + 2a_2 a + a_1$$

Así se obtiene la fórmula de derivación de los polinomios.

b- Hipérbolas y función inversa

Determinemos las tangentes en el caso sencillo de la gráfica de la función de referencia  $f(x) = 1/x$  en un punto de abscisa  $a \neq 0$ .

1. Sistema:  $y = \frac{1}{x}$  ;  $y = k(x-a) + \frac{1}{a}$

2. Ecuación y factorización:  $\frac{1}{x} = k(x-a) + \frac{1}{a} \Rightarrow (x-a) \cdot [k + \frac{1}{ax}] = 0$

3. Anulación en  $x=a$  del segundo factor:  $k = -\frac{1}{a^2}$ .

Así se obtiene la fórmula de derivación de la función inversa.

c- Raíz cuadrada

Se estudia aquí un caso sencillo: la gráfica de la función de referencia  $f(x) = \sqrt{x}$  en un punto de abscisa  $a > 0$ .

1. Sistema:  $y = \sqrt{x}$  ;  $y = k(x-a) + \sqrt{a}$

2. Ecuación y factorización:  $\sqrt{x} = k(x-a) + \sqrt{a} \Rightarrow (x-a) \cdot [k - \frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{x}}] = 0$

3. Anulación en  $x=a$  del segundo factor:  $k = \frac{1}{2\sqrt{a}}$ .

Así se obtiene la fórmula de derivación de la raíz cuadrada.

d- Lemniscata

Buscamos la tangente en  $O(0,0)$  a la curva en forma de ocho:

1. Sistema:


$(x^2 + y^2)^2 - x^2 + 3y^2 = 0$  ;  $y = k(x-0) + 0$

2. Ecuación y factorización:

$(x^2 + k^2 x^2)^2 - x^2 + 3k^2 x^2 = 0$   
 $\Rightarrow x^2 \cdot [x^2(1+k^2)^2 - 1 + 3k^2] = 0$

3. Anulación en  $x=0$  del segundo

factor:  $k = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ .



El hecho de que  $O$  es un punto múltiple apenas modifica el método: la substitución de  $y = kx$  en la ecuación de la curva ya se ha visto en el caso de los círculos, y lo único nuevo es la adaptación que consiste en factorizar por  $(x-0)^2$ , y no simplemente por  $(x-0)$ . El método requiere la factorización por la potencia máxima de  $(x-a)$ . Podemos observar que las secantes en  $O$  forman una intersección de orden 2; excepto dos de ellas, las tangentes, que forman una intersección de orden 4. Al usar los medios actuales de la enseñanza, tendríamos que descomponer las dos ramas en  $O$ . El estudio resultante es mucho más complejo que el que presentamos.

#### e- Curva con cúspide,

Determinamos la tangente a la cardioide en su cúspide  $O$ :


$$1. \text{ Sistema: } (x^2+y^2-x)^2-(x^2+y^2) = 0 ; y = k(x-0)+0$$

2. Ecuación y factorización:

$$(x^2+k^2x^2-x)^2-(x^2+k^2x^2) = 0 \\ \Rightarrow x^2 \cdot [(x+k^2x-1)^2-(1+k^2)] = 0$$

3. Anulación en  $x=0$  del segundo factor:  
 $k = 0$ .

Podemos observar que las secantes en  $O$  forman una intersección de orden 2, excepto una de ellas, la tangente, que forma una intersección de orden 3. Las tangentes en cúspides constituyen un caso algo delicado en cálculo, aquí lo único particular es que las secantes son de orden 2 en vez de 1.



#### f- Curva con dos semi-tangentes

Determinamos la tangente en  $O(0,0)$  a la curva representada:


$$1. \text{ Sistema: } y = \sqrt{x^3 + x^2} ; y = k(x-0)+0$$

2. Ecuación y factorización:

$$kx = \sqrt{x^3 + x^2} \Rightarrow x^2 \cdot [x+1-k^2] = 0$$

3. Anulación en  $x=0$  del segundo factor:  $k = \pm 1$ .

Las dos semi-tangentes se obtuvieron como resultado de un único cálculo, sin necesidad de dos estudios separados. Además podemos observar que las secantes en  $O$  forman una intersección de orden 2, excepto dos



de ellas, las tangentes, que forman una intersección de orden 3.

g- Cuando el método no produce ningún resultado...

Determinamos la tangente en  $O(0,0)$  a la curva de ecuación:  $x^3 - x^2 - y^2 = 0$ .

1. Sistema:  $x^3 - x^2 - y^2 = 0$  ;  $y = k(x-0)+0$

2. Ecuación y factorización:  $x^3 - x^2 - k^2 x^2 = 0 \Rightarrow x^2 \cdot [x - 1 - k^2] = 0$

3. Anulación en  $x=0$  del segundo factor:  $k^2 + 1 = 0$ .

Las rectas de la forma  $y = kx$  forman en  $O$  una intersección de orden 2. Pues sólo queda la recta de ecuación  $x=0$  como posible tangente. Con ella se obtiene la ecuación:  $-y^2 = 0$ . Entonces ella forma una intersección doble, del mismo orden de las secantes. Debemos concluir que no hay tangente en  $O$ . Pero eso no nos debe sorprender, puesto que el punto  $O$  es un punto aislado de la curva.

## Anexo D - Justificación del método

El teorema que sigue muestra que el método funciona en todos los casos (no demostraremos que la noción de tangente en análisis generaliza la noción presentada aquí):

*Las secantes en un punto  $A$  no aislado de una curva algebraica forman una intersección del mismo orden de multiplicidad  $v$ , excepto a lo más  $v$  de ellas que forman una intersección de orden de multiplicidad estrictamente superior a  $v$ .*

Vamos a probar este resultado en el punto  $O(0,0)$  de una curva algebraica, dado que es siempre posible hacer un cambio de sistema de ejes que produce esta situación, excepto en el caso evidente de ecuaciones de la forma  $C^e = 0$ . Denotamos por  $n$  el grado de la ecuación

y  $v$  su valuación (la potencia mínima en  $x$  y  $y$  que aparece en la ecuación); entonces  $n \geq v > 0$ .

1. Sistema:  $\sum_{i+j=v}^n a_{i,j} x^i y^j = 0$  ;  $y=kx$

2. Ecuación y factorización:

$$\sum_{i+j=v}^n a_{i,j} k^j x^{i+j} = 0 \Rightarrow x^v [P_v(k) + P_{v+1}(k)x + \dots + P_n(k)x^{n-v}] = 0,$$

donde  $P_l(k) = a_{l,0} + a_{l-1,1} \cdot k + \dots + a_{0,l} \cdot k^l$ ,  $v \leq l \leq n$ , es un polinomio cuyo grado es  $l$  o menos. Dado que  $v$  es la valuación de la ecuación, el polinomio  $P_v$  no puede ser nulo. Entonces, las secantes forman intersecciones de orden de multiplicidad  $v$ , excepto en los casos particulares de orden superior considerados a continuación.

3. Anulación en  $x=0$  del segundo factor:  $P_v(k)=0$ .

Tenemos que determinar las raíces de un polinomio no nulo de grado a lo más  $v$ . Son estas raíces que definen las tangentes.

La recta de ecuación  $x=0$  es una tangente bajo la condición de que la raíz

0 de  $\sum_{j=v}^n a_{0,j} y^j = 0$  tenga un orden de multiplicidad estrictamente superior

a  $v$ , lo que significa que  $a_{0,v}=0$ . Esto implica que el grado de  $P_v$  es a lo más  $v-1$ . En todos casos, tenemos a lo más  $v$  tangentes en  $O$  que forman intersecciones de orden de multiplicidad estrictamente superior a  $v$ .

Queda por estudiar el caso en el que el método no da ninguna tangente:  $P_v$  es de grado  $v > 0$  ( $a_{0,v} \neq 0$ ) sin raíz real. La ecuación de la curva se puede escribir bajo la forma  $B(x,y) + A(x,y) = 0$  donde  $B$  es la suma de los monomios de grado estrictamente superior a  $v$ , y  $A$  es la suma de los monomios de grado  $v$ . Los coeficientes de  $A$  son los de  $P_v$ , entonces hay una constante  $K > 0$  tal que:  $\forall (x,y), |A(x,y)| \geq K \|(x,y)\|^v$ . Por razones de continuidad,

$$\exists \varepsilon > 0, \forall (x,y) \text{ tal que } \|(x,y)\| < \varepsilon, |B(x,y)| \leq \frac{K}{2} \cdot \|(x,y)\|^v.$$

Entonces  $O$  es el único punto de la curva en la bola de centro  $O$  y de radio  $\varepsilon$ . Esto significa que el punto  $O$  es aislado (como en el ejemplo del Anexo C-g).